



## A geodinâmica interna e externa

José Manuel Fernandes Moça

Copyright 2019, SBGf - Sociedade Brasileira de Geofísica

This paper was prepared for presentation during the 16<sup>th</sup> International Congress of the Brazilian Geophysical Society held in Rio de Janeiro, Brazil, 19-22 August 2019.

Contents of this paper were reviewed by the Technical Committee of the 16<sup>th</sup> International Congress of the Brazilian Geophysical Society and do not necessarily represent any position of the SBGf, its officers or members. Electronic reproduction or storage of any part of this paper for commercial purposes without the written consent of the Brazilian Geophysical Society is prohibited.

### Abstract

It is shown that the internal and external geodynamics can be explained by the geodynamics resulting from the slow but steady recovery of the Earth's sphericity lost in a planetary collision about 600 million years ago, when it then became almost conical in appearance after having lost the most of its mass, its crust and its water, becoming a much smaller planet. The mass cone was composed of the remaining concentric spherical shells of the mantle. The recovery of sphericity is due to the movement of all the layers of the interior of the Earth towards the Pacific region, the place of the collision and also where the tip of the cone whose base was opposite in the region of Pangea, set of pieces of the crust that was not sent to outer space. The tip of the cone sank towards the new center of gravity as it was denser and was being covered by the less dense layers. The part of the mantle that did not get escape velocity fell on the remaining crust, the Pangea, including the ores that began to compose the randomly distributed deposits and sank in the ice-cold and salty global ocean about 8,3 km deep that it was drained to the upper part of the mantle and that resulted in the Pantalassa ocean. The magnetic field was formed, continuous to the collision, by the concave layer of Iron that generated a concave magnet and that was many more intense than the current one. The layers of the mantle, such as concentric spheres, including that of Iron, slide to reach the same thickness at all points on the sphere. This process although it has started 600 MA ago, has not yet finished due to the tiny difference in density between the nearest layers, a proton and a neutron, on average. The energy that moves such large masses is the gravitational potential energy. Thus, the internal geodynamics is the mantle movement in the recovery of sphericity and the external geodynamics is the its consequences in the crust.


### Introdução


O objetivo deste trabalho é descrever a geodinâmica Interna e externa das suas conseqüências tais como a ausência da maior parte da crosta original ou continental, a formação do campo magnético, o permanente e também o intermitente vulcanismo e sismicidade globais, os tsunamis, a formação de grandes cadeias de montanhas, mares internos e lagos salgados, a origem das jazidas de minerais, a origem do petróleo sobre a crosta e no fundo dos oceanos, assim como as grandes questões da Paleontologia e algumas de Astronomia.

Isto preencherá um imenso buraco no conhecimento humano sobre nosso planeta, pois estamos investindo gigantescos esforços na exploração de outros astros para compreender e montar a história daquele que está debaixo de nossos pés. Estes fenômenos não estão ainda compreendidos e não existia uma explicação científica aplicável a todas as questões conhecidas em aberto. A causa da geodinâmica estava sendo buscada desde 1878 no primeiro Congresso Internacional de Geologia, em Paris.

### Revisão teórica

Na investigação, em relação à geodinâmica, foi verificado que as hipóteses *Ad hoc* "Mantle Plumes" e "Hotspots", que vêm servindo de referencial teórico para a Tectônica de Placas, durante os últimos 50 anos, e que tentam explicar a geodinâmica, incluindo o levantamento de magma através dos vulcões do Hawaii e o desaparecimento da maior parte da crosta continental no volume de 16,56 bilhões de km<sup>3</sup> (360 milhões de km<sup>2</sup> x 46 km de espessura e com 2,8 t/m<sup>3</sup> que teria que estar flutuando no manto de 3,3 t/m<sup>3</sup>. Estas hipóteses não foram submetidas ao Método Científico, pois não passariam porque não se sustentam, pois não levam em conta que a superfície dos líquidos permanecem planos, por ação da gravidade, mesmo sendo adicionado calor a eles, pois só gases sobem além da superfície quando o líquido atinge o ponto de ebulição, não podendo-lhes, assim, ser atribuída qualquer ação sobre a crosta, ou dinâmica externa, nem levantar magma através dos vulcões do Hawaii que para isto precisam de pressão superior a 33.000 t/m<sup>2</sup> (10.000 m X 3,3 t/m<sup>3</sup> de densidade), acima do leito oceânico. Além disto, elas foram desenvolvidas sem o cuidado de levar em conta que correntes convectivas são próprias de meios homogêneos e que o manto da Terra é heterogêneo, pois é formado de esferas concêntricas de elementos cada vez mais densos no sentido do núcleo sendo a mais exterior a de magnésio, que compõe o basalto, a parte superior do manto com 3,3 t/m<sup>3</sup> e o urânio e outros elementos com densidade próxima de 20 t/m<sup>3</sup>, no núcleo. A espessa esfera de ferro com 7,87 t/m<sup>3</sup> fica em uma posição intermediária do planeta que tem densidade total de 5,51 t/m<sup>3</sup>.





**Figura 1:** Três Exemplos de interpretação de Mantle Plumes e Hotspots

A Figura 1 tem três ilustrações onde constatamos a incongruência entre elas e assim a dificuldade de se usar estas duas hipóteses para explicar a geodinâmica interna e externa visto que a interpretação de cada um difere em muito da de outro e também de todas as imagens disponíveis em todos os meios de divulgação científica.

O conhecimento de que a parte superior de elementos em estado de fusão permanece plana foi usado para criar o vidro *float* nos anos 50 na Inglaterra, para a fabricação de vidro plano de alta qualidade por não possuir quase nenhuma distorção óptica porque o vidro em estado de fusão e flutua no estanho que também está em estado de fusão, é mais denso e conseqüentemente o vidro se espalha uniformemente sobre o estanho resultando em um vidro quase perfeito.

O manto da Terra está em estado de fusão, com a parte superior perto de 1400° C. Na formação da crosta dos planetas rochosos massa sai do manto, por ebulição, pelos furos de grande diâmetro conhecidos por vulcões caldeiras. Por mais que adicionemos calor a um material em estado de fusão não se observa subida de líquido acima da superfície, mas somente se observa a subida de gases quando o material atinge o ponto de ebulição. Isto é suficiente para descartar estas duas hipóteses *Ad hoc*, a "Mantle Plumes" e "Hotspots" como sendo as causas da geodinâmica.

### Metodologia

O método utilizado neste trabalho foi o Observacional-Indutivo. Foi conseqüência de observações e de indagações ocasionais à luz das leis da Física e da Química sobre o enigmático estado traumático da crosta continental tais como a ausência da maior parte dela e o deslizamento radial dos continentes, a partir da África, no sentido do centro do Pacífico, e ao acompanhar os avanços da ciência e que resultaram em um *insight*, em 2004, que me levou a concluir que isto só poderia ocorrer se o planeta não estivesse perfeitamente esférico e que uma grande depressão associada à perda de massa, incluindo a maior parte da crosta, devido a uma provável colisão com outro planeta, explicaria tanto a ausência de 70% da crosta original, da superfície atual, e o deslocamento radial dos continentes, por deslizamento ou escorregamento, a partir da África durante 200 MA, utilizando a energia potencial gravitacional, quanto a fratura paulatina das placas que restaram para se adaptarem ao planeta, agora, de menor massa e,


conseqüentemente, de menor raio e curvatura mais acentuada, explicando, assim também, a existência das milhões de falhas na crosta, dos grandes canyons, de tão extensas e profundas cavernas e levantamento de cadeias de montanhas de idades diferentes. A perda de crosta e de massa de um planeta só pode ocorrer devido a uma colisão com outro planeta.

Imediata e conseqüente investigação serviu para procurar evidências para testar e refutar ou apoiar a idéia principal da colisão planetária. A análise das informações existentes serviu para descobrir e encaixar as peças do grande quebra-cabeça.


Na procura pelo planeta envolvido, se ainda estivesse em órbita, deduzi que ele teria órbita interna por ter colidido quando se dirigia para o afélio, o ponto mais distante de sua órbita, pois se fosse o contrário, ou seja, quando se dirigia para o periélio teria empurrado a Terra para uma queda no Sol. Ao procurar por imagens do planeta mais provável, Vênus, nos sites da NASA, descobri a área que estava procurando; um conjunto de linhas paralelas de atrito cruzando, em 90°, outro conjunto de linhas paralelas de fraturas, em Lakshmi Region, seguida de uma área de linhas concêntricas de fraturas, em Aphrodite Terra, resultantes do impacto e mergulho no manto da Terra e também que está com 80% de sua superfície coberta com lava solidificada, predominantemente composta de basalto, que foi obtida da parte superior do manto da Terra.

### Resultados

A geodinâmica interna da Terra é resultante da constante, mas lenta recuperação da esfericidade da Terra perdida em uma colisão planetária com Vênus há 600 MA (Fernandes-Môça, J,M, 2008). Antes da colisão a crosta estava estabilizada e se auto-sustentava como a crosta de qualquer outro planeta. O planeta quer voltar a ser uma esfera, o menor estado de energia potencial e de maior estabilidade. Afinal, a gravidade reivindica a totalidade. Este processo embora tenha se iniciado há 600 MA ainda não terminou devido à diferença ínfima de densidade entre as camadas mais próximas, um próton e um nêutron, em média. A energia que move tão grandes massas é a energia potencial gravitacional.




**Figura 2:** Iminente colisão planetária de Vênus com a Terra no cruzamento de suas órbitas quando Vênus se dirigia para seu afélio, em órbita de alta excentricidade e conseqüentemente altíssima velocidade. Um gelado e profundo oceano global cobria todo o planeta Terra.




**Figura 3:** A massa que sobrou da Terra tinha aspecto quase cônico.

Metais e outras matérias caíram sobre os pedaços da crosta remanescente, o Pangea, por não conseguirem velocidade de escape. Massa orgânica, composta de bactérias, protozoários e microalgas, que existia durante 3 bilhões de anos, se espalhou pelo Sistema Solar. Vênus não foi desintegrado porque além de ter espessura de crosta próximo de 100 km tem uma curvatura mais acentuada, devido ao raio muito menor, que lhe conferia uma dureza relativa muito maior, no entanto está cheio de fraturas e muitas outras evidências de que se envolveu em uma colisão planetária.




**Figura 4:** O campo magnético foi instantaneamente formado pela calota de Ferro, o ímã inicial. O mergulho de massas mais densas através da camada de ferro, no sentido do novo centro de gravidade, alterou o formato do ímã muitas vezes e resultou nas inversões de pólos.



**Figura 5:** A Terra há 600 MA, após perder um volume de massa varias vezes a atual. A massa perdida espalhou-se como asteróides e cometas pelo Sistema Solar. Os que não conseguiram velocidade orbital caíram no Sol.


Como o formato cônico da massa remanescente é o formato mais provável devido ao astro ser esférico e essencialmente líquido e heterogêneo, a altura do cone,

que era o raio do planeta antes da colisão, pode ser obtido a partir do volume atual e da superfície da base do cone que compunha o Pangea. Com a altura do cone como raio da esfera, pode-se obter o volume anterior da Terra ou da Super-Terra.



**Figura 6:** Grande parte da água ficou em estado de vapor devido ao contato direto com o manto a descoberto e gerou intensas descargas por dezenas de milhões de anos que resultou na Explosão do Cambriano.

As massas mais densas do manto iniciaram o mergulho no sentido do novo centro de gravidade e as menos densas iniciaram o movimento de cobertura que continua até hoje.



**Figura 7:** A Terra, o que restou da Super-Terra, já com a esfericidade quase toda recuperada, após 600 MA. A demora é resultante da diferença de um próton e um nêutron, em média, entre os elementos mais próximos.


O aporte de massa tende a terminar de preencher a grande depressão na região do Pacífico, tal como um suave vórtice, atualmente com o leito oceânico com próximo de 804 metros, em média, abaixo da profundidade média dos outros oceanos e mares que corresponde a uma massa equivalente a 133 milhões de km<sup>3</sup> faltantes naquela região, ou seja, ali a distância do leito oceânico até o centro de gravidade é menor que no restante do planeta. No entanto, observa-se que o aporte de manto está gerando uma pressão superior a 33.000 t/m<sup>3</sup> que levanta magma com 3,3 t/m<sup>3</sup> acima de 10.000 m do leito oceânico, próximo do Hawaii, ou 10 km abaixo da borda do vórtice, que caracteriza que o déficit naquela região é imenso e poderá vir a ser mais bem calculado, já envolvendo a área em torno.

O deslocamento de massa para a região do Pacífico, evidenciado na saída ininterrupta de magna nos vulcões do Hawaii, vai acentuando a esfericidade e além de

suspender, alternadamente, as placas oceânicas, que provoca tsunamis por terem suspenso água acima do leito oceânico e que é escoada radialmente. Este deslocamento de manto também diminui a sustentação das placas em outras regiões consideradas assísmicas provocando a sismicidade intraplaca e altera o nível de magma nos vulcões, que freqüentemente atuam como válvula de alívio, evitando alguns terremotos ou aumento de magnitude de outros.


O deslizamento dos continentes é radial a partir da África no sentido do centro do Pacífico, contornando o planeta, e a Índia já fazia parte da placa Euro-asiática e foi junto no escorregamento com rotação e deixou espaço para a formação da península arábica que está sobre basalto a parte superior do manto e é composta de massa orgânica que resultou no petróleo e estava na fratura e foi sendo misturada a sedimentos e meio de subidas de basalto em tempos diversos.

Devido ao escorregamento, as placas continentais pressionam a as placas oceânicas e à medida que o leito do Pacífico vai sendo suspenso vai ocorrendo uma maior acentuação da curvatura naquela região e vai sendo deixado espaço para o avanço delas.




**Figura 8:** Vulcão do Hawaii. O deslocamento quase horizontal e contínuo de massa para a região do Pacífico causa, na parte inferior da crosta oceânica, uma pressão superior a 33.000 t/m<sup>2</sup> que mantém o fluxo de lava. O magma sobe até a linha ideal e temporária (pontilhada) do manto na região.

O aporte de massa gera pressão suficiente para suspender, alternadamente, placas oceânicas que causam tsunamis. O sistema de vulcões da região do Hawaii é resultante de uma extensa fratura na crosta oceânica.



**Figura 9:** A crosta fratura devido a adaptação da crosta a uma curvatura mais acentuada de um planeta agora de menor raio e causa canyons. A massa erodida dos canyons cai gradativamente na fendas. A gigantesca massa erodida do Grand Canyon está, ali, na própria fenda.



**Figura 10:** Formação de um batólito.

Exemplo de processo que atuou na Orogênese suspendendo e/ou fraturando o material existente e adicionando outros de diferentes constituições em camadas. O magma sobe até o nível ideal (pontilhada), da curvatura do manto do momento. Quando o magma sobe além do solo que o formata lateralmente ele transborda ou fica plano na parte superior quando coincidem as alturas e produz mesas de material magmático. A pressão era mantida e ocorria a solidificação.

As placas não conseguem acompanhar a curvatura dinâmica do manto devido à rigidez e convexidade e comportam-se como faces de um poliedro irregular. Vulcões são fissuras não consolidadas e são ativados sempre que o manto tiver acentuação de sua curvatura na região ou quando ocorre descida da crosta por falta de sustentação nos casos que resultam em sismicidade intraplaca. Vulcões atuam como válvulas de alívio evitando o aumento da magnitude dos terremotos ou adiando-os. Outros, os explosivos, são aqueles que durante a inatividade acumularam água em seu interior e que foi fechado por sedimentos finos. Quando o magma chega aquece a água que entra em evaporação e submetida a alta pressão penetra no magma produzindo a pedra pomes e quando o aporte de magma continua e fratura o material que tampava o vulcão, a pressão é liberada e ocorre a explosão. Em uma montanha que tem um vulcão primeiro sai o vapor d'água, depois a água que está infiltrada na montanha é aquecida, entra em evaporação, retorna a torre e entra em contato com a coluna de lava e produz, com explosões, os cinzentos cristais de silício. A boca inferior dos vulcões pode estar dentro de uma das camadas do manto tal como a do Vulcão Kawah Ijen, em Java, que está na camada de enxofre.


Nas datações de intrusões magmáticas deverá ser levado em conta que o magma atravessa mais de 44 km de crosta e arranca das paredes, cristais antigos de camadas formadas em épocas anteriores e metais jogados sobre a crosta devido à colisão, incluindo o Zr, o U e Th, e com isto caracterizando contaminação e podendo induzir a erro.

A existência de um processo de recuperação da esfericidade através da segregação gravimétrica e a

conseqüente adaptação gradativa da crosta levou a crosta, cujas placas são convexas, a fraturarem pelo processo de alavanca do tipo interfixa ou *first class* e deixar passar o magma que atuava no fulcro, pois não conseguiu escapar lateralmente, e que resultou no levantamento das cadeias de montanhas em épocas diversas, incluindo os Himalaias, Andes e Montanhas Rochosas e sustentou a pressão, de dezenas de milhares de toneladas por m<sup>2</sup> até a solidificação e também produziu extensos canyons que produzem cavernas. O *East African Rift EAR* é uma evidência da acentuação da curvatura do manto e é o maior sistema de fissuras sismicamente ativo da Terra atualmente. Este é o processo que fez escoar os grandes lagos, tais como o do Saara e Bacia do Paraná que resultou em grandes aquíferos como por exemplo o Aquífero Guarani e portanto não devemos estranhar que no fundo dos aquíferos haja água salgada, pois o cloro e o sódio tem maior densidade que a água. Estes grandes lagos formados após o escoamento do que restou do Oceano Global eram salgados inicialmente e foram o ambiente de desenvolvimento da vida complexa. Devido à perda da maior parte da crosta a água remanescente entrou em contato com o manto com temperatura a partir dos 1400°C mudando drasticamente de planeta gelado para envolto em vapor em um ambiente completamente elétrico, por dezenas de MA, que somado à chuva de minérios, alguns radioativos, originários do manto e distribuídos aleatoriamente sobre a crosta remanescente, alterou quimicamente o ambiente e provocou a Explosão do Cambriano ou a explosão da complexidade dos organismos, dando origem à Evolução dos seres vivos e isto causou o Dilema de Darwin ao aparecerem fósseis somente aos 542 MA, 58 MA após a colisão, com o início do levantamento das montanhas que sepultava os animais abruptamente os animais que viviam por ali.

A data de 600 MA foi extraída da Snowball Earth Theory (Hoffman, P.F. and Schrag, D.P., 1999), que defende que a Terra mudou de cobertura de neve para super-quente em tempo recorde, mas seus autores pensam que ocorreu um efeito estufa por liberação de CO<sub>2</sub> na atmosfera, ou seja, a energia seria a do Sol. Desconhecem, ainda, que o que elevou repentinamente a temperatura ambiente foi o contato direto da água, remanescente, com o manto a descoberto, por ausência da crosta enviada para o espaço exterior e que a grande liberação de CO<sub>2</sub> na atmosfera e registrada em rochas foi conseqüência do violento aquecimento das águas. Assim, foi um agente externo que tirou a Terra da armadilha em que se encontrava, pois o albedo impedia o aquecimento. Esta é a peça que estava faltando no quebra-cabeça e que a impediu de ser reconhecida.

Embora a Terra estivesse em uma mais próxima do Sol, pois foi deslocado para a órbita atual, o Oceano Global estava permeado pela massa orgânica composta de microorganismos e o esfriamento foi resultado da absorção do calor pelas endotérmicas ligações bioquímicas no processo de reprodução dos organismos que eram muito simples, durante 3 bilhões de anos, devido à pouca variedade química disponível na água, carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio e isto impedia o aumento de complexidade.



**Figura 11:** O movimento quase horizontal e contínuo de parte da camada ou esfera de Ferro gera o atrito que mantém o campo magnético da Terra. Não há diferença de velocidade angular entre as esferas do manto.

O campo magnético terrestre tem uma relação direta com geodinâmica interna que é devido à lenta, mas constante recuperação da esfericidade da Terra.

1) O campo magnético inicial foi formado, ato contínuo à colisão planetária, pela camada côncava de Ferro remanescente que gerou um ímã côncavo e que era muitas vezes mais intenso que o atual.

2) O campo magnético é mantido pelo movimento de fina camada de ferro originária de um local com grande espessura de qualquer região do planeta para o local de menor espessura, a região do Pacífico, e isto gera o atrito tão procurado. A camada movimenta-se tal como todas as outras do manto no sentido do centro do Pacífico na tentativa de que esta camada venha a ter a mesma espessura em toda a esfera tal como antes da colisão.

3) As inversões dos pólos foram resultado das deformações do ímã que partiu do formato côncavo para o esférico. As deformações foram resultado do mergulho dos elementos mais densos que o Ferro que formavam a ponta do cone de massa remanescente e atravessavam a camada de Ferro, por diferentes locais e em tempos diversos no sentido do novo centro de gravidade, buscando sua posição relativa, por segregação gravimétrica. Houve várias inversões no intervalo de 400 MA, quando o manto da Terra estava ainda com o formato abaulado, entre os 600 MA quando da existência da Pangea e os 200 MA quando começaram os escorregamentos radiais das placas da crosta no sentido do centro do Pacífico, e podem ter ficado registradas nas Banded Iron Formation (BIF). Nos últimos 200 MA houve muitos registros de inversões de polaridade devido ao ferro erodido e originário dos depósitos na parte superior da crosta que entrou em contato com o magma após ter subido até o leito oceânico no momento da separação das placas. O primeiro registro foi feito com o esfriamento do magma no momento inicial da separação das placas continentais naquela região do planeta.

A magnetita é resultante da queda do ferro originário do manto, com alta temperatura, sobre o oceano gelado, em

processo de escoamento e como a formação do campo magnético foi imediata, o ferro esfriou durante o mergulho sob a ação do inicial e forte campo magnético que fixou a orientação das linhas magnéticas.

4) O enfraquecimento gradativo do campo magnético é devido à contínua recuperação da espessura da camada de Ferro que faz com que o avanço seja feito por uma camada cada vez mais fina.

### Conclusões, previsões e sugestões

A geodinâmica interna é resultante da lenta, mas constante recuperação da esfericidade da Terra perdida em uma colisão planetária com Vênus há cerca de 600 MA quando então, ato contínuo, ficou com um aspecto quase cônico após ter perdido a maior parte de sua massa, de sua crosta e de sua água, tornando-se um planeta bem menor. A massa remanescente, já com novo centro de gravidade, ficou compondo um cone de calotas esféricas concêntricas formadas pelos elementos de densidades diversas onde a calota de Ferro formava o ímã do inicial e forte campo magnético e a geodinâmica externa são suas conseqüências na crosta.

A recuperação do formato esférico é exercida através da movimentação quase horizontal de suas camadas ou esferas concêntricas de elementos no sentido do centro da região do Pacífico, o local da colisão, onde ficava a ponta do cone e a base, opostamente, na região da Pangea, formada pelos pedaços remanescentes da crosta original que não foram enviados para o espaço exterior. Esta movimentação obedece à ordenação por segregação gravimétrica e atualmente está com a esfericidade quase refeita.

As placas remanescentes deslocam-se radialmente no sentido do Pacífico há 200 MA.

A incessante sismicidade e vulcanismo globais são conseqüências da adaptação da crosta na acentuação constante da esfericidade do planeta, agora com menor raio, ao recompor o sistema de esferas concêntricas, onde o deslocamento radial de massa para a região do Pacífico faz o magma sair constantemente pelos vulcões do Hawaii e também suspende alternadamente as placas oceânicas que conseqüentemente levantam a água, acima do nível normal do oceano, e que é escoada radialmente e isto causa os tsunamis.

As jazidas de minerais assim como outros materiais resultam da queda de parte das esferas do planeta que não conseguiram velocidade de escape.

A sismicidade intraplaca decorre do deslocamento de manto que tanto diminui a sustentação da crosta em algumas regiões, consideradas assísmicas quando acentua a curvatura em outras e provoca os mesmos efeitos.

Os vulcões são fissuras não consolidadas e são ativados sempre que o manto tiver acentuação de sua curvatura na região ou quando ocorre descida da crosta por falta de sustentação nos casos que resultam em sismicidade

intraplaca. Os vulcões freqüentemente atuam como válvula de alívio, evitando alguns terremotos ou aumento de magnitude de outros. A diferença de altura é mínima, mas como as placas são extensas resulta em volume de magma considerável.

Não é possível prever a ocorrência de determinado terremoto, embora possa haver um ciclo de repetição de grandes terremotos porque a movimentação do manto é global, no entanto é possível afirmar que ocorrerão trilhões de grandes terremotos antes do planeta atingir a esfericidade ideal e isto é muito importante, pois este conhecimento precisa ser usado para a formulação de políticas públicas para edificações incluindo barragens, pontes e oleodutos que vem sendo construídas em fraturas na crosta, para minimizar o sofrimento das populações e de danos ao patrimônio público. Deve-se, assim, atuar na prevenção.

Sugiro à Geological TimeScale Foundation que defina o início do período Cambriano a partir dos 600 Milhões de Anos, visto que foi quando houve a liberação de energia e todas as outras condições que possibilitaram a explosão de complexidade dos organismos, a Explosão do Cambriano.

### Referências:

Fernandes-Môça, J,M, 2008, "Quando Vênus Colidiu com a Terra – O extraordinário evento ocorrido há 600 milhões de anos que mudou a história da Terra", José Manuel Fernandes Moça, Rio de Janeiro, ISBN 978859089-6, 250 p.

Fernandes-Moça, J,M, "Vênus colidiu com a Terra há 600 Milhões de anos", disponível no URL: [www.venusterra.com.br](http://www.venusterra.com.br)

Gary A. Glatzmaier, "What causes the periodic reversals of the earth's magnetic field? Have there been any successful attempts to model the phenomenon?", Scientific American, disponível no URL: <http://www.scientificamerican.com/article/what-causes-the-periodic/>

Hoffman, P.F. and Schrag, D.P., 1999, Response: Considering a Neoproterozoic Snowball Earth, Science, disponível no URL: <http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/284/5417/1087a>

John McDaris, Mantle Plumes and Convection Visualizations, disponível no URL: [http://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/deepearth/visualizations/mantle\\_conv.html](http://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/deepearth/visualizations/mantle_conv.html)

Paul H. Roberts and Gary A. Glatzmaier, Geodynamo theory and simulations, REVIEWS OF MODERN PHYSICS, Rev. Mod. Phys. 72, 1081 – Published 1 October 2000, American Physical Society, disponível no URL: <http://journals.aps.org/rmp/abstract/10.1103/RevModPhys.72.1081>.