

## ESTUDO DA ATIVIDADE SÍSMICA EM SÃO CAETANO – PE EM 2007

**Heleno Carlos de Lima Neto**

Orientador: Dr. Joaquim Mendes Ferreira (UFRN)  
127 p. – Dissertação (Mestrado) – Defesa 06.03.2009

**RESUMO.** Nesta dissertação foi estudada a atividade sísmica no município de São Caetano, estado de Pernambuco, Nordeste brasileiro, localizado próximo ao Lineamento Pernambuco. Lineamento Pernambuco é uma zona de cisalhamento Neoproterozóica de escala continental que deforma a província Borborema. A sismicidade estudada ocorreu numa ramificação para nordeste do Lineamento Pernambuco. A atividade sísmica em São Caetano iniciou em 2006 e no dia 20/05/2007 ocorreu, neste município, um sismo de magnitude 4,0 m<sub>b</sub>. Este é o sismo de maior magnitude que ocorreu no estado de Pernambuco. Este trabalho é decorrente da análise de dados coletados durante o período de monitoramento na região que foi de 01/02/2007 até 21/07/2007. Nesse monitoramento foi utilizado de seis até nove estações sismográficas digitais. Os dados coletados por essas estações foram analisados, objetivando a determinação dos hipocentros e do mecanismo focal composto. Foram utilizados 214 sismos, registrados em pelo menos três estações. Na determinação hipocentral, foi utilizado o programa HYPO71, assumindo-se um modelo de semi-espaco, com os parâmetros: velocidade da onda P ( $V_P$ ) e razão  $V_P/V_S$ , respectivamente, 5,90 km/s e 1,70. Os hipocentros dos sismos ocorridos na região deste estudo acompanham uma ramificação para nordeste do Lineamento Pernambuco e possui aproximadamente 4 km de extensão e profundidade variando entre 2 até 8 km. O mecanismo focal composto foi feito para um conjunto de 14 sismos selecionados. Nós primeiramente tentamos encontrar a solução do plano de falha considerando apenas a distribuição de polaridades utilizando o programa FPFIT. Os resultados foram:  $43^\circ \pm 15^\circ$  para o azimute,  $59^\circ \pm 9^\circ$  para o mergulho e  $-142^\circ \pm 15^\circ$  para o *rake*. Nós também ajustamos o plano usando a distribuição hipocentral. Os resultados obtidos foram:  $58^\circ$  para o azimute,  $55^\circ$  para o mergulho. O valor do *rake* foi fixado em  $-155^\circ$ . Este resultado mostra um mecanismo de uma falha transcorrente dextral com uma componente normal. Esta dissertação mostra, mais uma vez, que existe uma boa correlação entre a sismicidade e falhas mapeadas na região próxima ao Lineamento Pernambuco e suas ramificações para nordeste.

**ABSTRACT.** In this dissertation we studied the seismic activity in the São Caetano county, Pernambuco State, Northeastern Brazil, located near the Pernambuco Lineament. The Pernambuco Lineament is a one of Neoproterozoic continental-scale shear zones that deforms the Borborema province. The seismicity occurred in a NE trending branch of Pernambuco Lineament. The seismic activity in São Caetano started in 2006 and in May 20<sup>th</sup>, 2006 a 4.0 m<sub>b</sub> earthquake hit there. This was the largest earthquake ever reported in Pernambuco State. This dissertation is the result of a campaign done in the period from February 1<sup>st</sup> 2007 to July 31<sup>st</sup> 2007. In this campaign up to nine three-component digital seismographic stations were deployed and the collected data was used to determine hypocenters and focal mechanism. A total of 214 earthquakes, recorded at least by three stations, were analyzed. To determine hypocenters and time origin the HYPO71 program was used assuming a half-space model with parameters:  $V_P$  (P-wave velocity) equal to 5.90 km/s and the ratio  $V_P/V_S$  1.70, where  $V_S$  is the S-wave velocity. The earthquakes hypocentral distribution was approximately 4 km long and agrees with the NE-SW direction of the Pernambuco Lineament branch. Hypocenters depth range from 2 to 8 km. The composed focal mechanism was made from a group of 14 selected earthquakes. We try firstly to find the fault plane solution matching the polarity distribution at stations, using the FPFIT program. The result was  $43^\circ \pm 15^\circ$  deg for strike,  $59^\circ \pm 9^\circ$  deg for dip and  $-142^\circ \pm 15^\circ$  deg for rake. We also fitted a plane using the hypocentral distribution to obtain the dip and azimuth of the hypocentral distribution. The results obtained by this fit were  $58^\circ$  deg for the azimuth,  $55^\circ$  deg for the dip and  $-155^\circ$  deg for rake. This result shows a mechanism of a strike-slip dextral fault with a normal component. This dissertation shows, once more, that there is a good correlation between the seismic activity and geological features in the region near the Pernambuco Lineament and its NE branches.